

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ $f_{S_2}$ , $f_{O_2}$ , $f_{CO_2}$ , $f_{Te_2}$ , $a_{S_2}$ , $a_{O_2}$ ΚΑΙ pH ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ Au-Ag-Te ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΛΑΡΔΙΑΔΩΝ, ΤΗΝΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ\*

ΣΤ. ΤΟΜΠΡΟΣ<sup>1</sup>, Κ.ΣΤ. ΣΕΥΜΟΥΡ<sup>1</sup>

## ΣΥΝΟΨΗ

Στην περιοχή Πανόρμου-Λαρδιάδων 20 Km βόρεια της Τήνου, χαλαζιακές φλέβες διεισδύουν στους ασβεστοδολομίτες και στους σχιστόλιθους και τα μάρμαρα της ένοπτης κυανοσχιστολίθων. Η Ag-Au-Te πολυμεταλλική μεταλλοφορία εμφανίζεται στο φλεβικό σύστημα των γαλακτόχρωμου και γκριζου χαλαζία και αναπτύσσεται σε 9 ακόλουθα στάδια (I έως IX) με απόθεση Βασικών Μετάλλων, Τελλονιούδιων, Αυτοφύων Πολυτύμων Μετάλλων και Υπεργενετικού σταδίου.

Βάσει της μεθόδου των χημικών ισορροπιών, έγινε αναπαράσταση των φυσικοχημικών παλαιοσυνθήκων  $f_{S_2}$ ,  $f_{O_2}$ ,  $f_{CO_2}$ ,  $f_{Te_2}$ ,  $a_{S_2}$ ,  $a_{O_2}$  και pH του υδροθερμικού μεταλλοφόρου ρευστού, κατά την διάφορα απόθεσης της μεταλλοφορίας, για το εύρος θερμοκρασιών απόθεσης της κύριας μεταλλικής παραγένεσης, από T=300°C ως T=190°C. Οι μεταβολές των υπολογιζόμενων παραμέτρων ήταν  $f_{S_2} = 10^{-8.3} \cdot 10^{-15.5}$ ,  $f_{O_2} = 10^{-32.1} \cdot 10^{-42}$ ,  $f_{CO_2} = 10^{+0.8} \cdot 10^{-0.2}$ ,  $f_{Te_2} = 10^{-6.73} \cdot 10^{-19.5}$ ,  $a_{S_2} = 10^{-7.5} \cdot 10^{-13.9}$ ,  $a_{O_2} = 10^{-41} \cdot 10^{-32.1}$ ,  $a_{Te_2} = 10^{-6.5}$  και pH = 4.95-6.9.

## ABSTRACT

The evolution of the physicochemical parameters, between 300°C to 190°C, in the hydrothermal fluid that has precipitated epithermal Ag-Au-Te ores in Panormos - Liardades Bay, was studied using the Guldberg-Waage chemical equilibration method. The range of the calculated values of the physicochemical parameters for this temperature interval were:  $f_{S_2} = 10^{-8.3}$  to  $10^{-15.5}$ ,  $f_{O_2} = 10^{-32.1}$  to  $10^{-42}$ ,  $f_{Te_2} = 10^{-6.73}$  to  $10^{-19.5}$ ,  $f_{CO_2} = 10^{+0.8}$  to  $10^{-0.2}$ ,  $a_{S_2} = 10^{-7.5}$  to  $10^{-13.9}$ ,  $a_{O_2} = 10^{-41}$  to  $10^{-32.1}$ ,  $a_{Te_2} = 10^{-6.5}$  and 4.95 - 6.9

**KEY WORDS:** Epithermal, Au-Ag-Te ores, quartz stockwork, Tinos, fluid evolution, physicochemical parameters.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μεταλλοφορία της περιοχής Πανόρμου-Λαρδιάδων τοποθετείται 16 Km δυτικά της τεκτονο-διεισδυτικής επαρφής του Μειοκανικού πλουτωνίτη της Τήνου, που συνίσταται από έναν 18 M.y. γρανοδιορίτη και έναν 14 M.y. λευκογρανίτη, (Mastrakas & Seymour, 2000). Η περιοχή είναι ένα τεκτονικό παράθυρο, με γενική ABA διεύθυνση, που αποκαλύπτει τους ασβεστοδολομίτες της ένοπτης βάσης και τους υπερκείμενους κυανοσχιστολίθους, πρασινοσχιστολίθους και μάρμαρα της ενόπτης κυανοσχιστολίθων.

Το φλεβικό σύστημα συνίσταται από τρία περίπου, φλέβες που γεμίζουν ένα σύνγεις σύστημα οριζόντιων ωργανώσεων. Αναγνωρίστηκαν δύο γενιές antitaxial φλεβών: η παλαιότερη του γαλακτόχρωμου χαλαζία, αριστερόστροφου, ανάστροφου χαρακτήρα με BBA έως BA διεύθυνση και η νεώτερη του γκριζου χαλαζία, δεξιόστροφου, κανονικού χαρακτήρα με BD έως ΔΒΔ διεύθυνση, που μετατοπίζει τον γαλακτόχρωμο χαλαζία. Οι φλέβες χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολύάριθμων φλεβιδίων, λατυποπαγών βρασμού και ζωνών εξαλλοιώσεως.

## ΜΕΘΟΔΟΣ

Για τον υπολογισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των χημικών ισορροπιών, (Henley et al., 1984, Ahmad et al., 1987, Cooke et al., 1996) και βιβλιογραφικά δεδομένα από συγγενή

\* CALCULATION OF THE PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS IN THE HYDROTHERMAL FLUID THAT HAS PRECIPITATED Au-Ag-Te ORES IN PANORMOS - LIARDADES BAY AREA, TINOS ISLAND, CYCLADES. 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών, Τμήμα Γεωλογίας, 265.00 Πάτρα.

επιθεωρικά κοιτάσματα με τη μεταλλοφορία. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν για το εύρος θερμοκρασιών απόθεσης της παραγένεσης, από  $T=300$  °C ως  $T=190$  °C, ένων η πίεση θεωρείται σταθερά μικρότερη από 1 Kbar. Χρησιμοποιήθηκε ο νόμος της χημικής ισοδροπίας ή νόμος δράσεως των μαζών των Guldberg-Waage, για στέρεα που βρίσκονται σε ισοδροπία με τα ιόντα τους ή τα ιοντικά τους σύμπλοκα, στο διάλυμα. Για την κάθε χημική ισοδροπία υπολογίστηκαν οι σταθερές διαλυτότητας  $K$ , εκφρασμένες σε logK, οι οποίες εξαρτώνται από την θερμοκρασία και την φύση των αντιδράντων και προϊόντων σωμάτων, (Πίνακας 1). Τα στερεά, τα αέρια και το  $H_2O$ , θεωρούνται ως ιδανικά τα οποία έχουν σταθερές συγκεντρώσεις και ενεργότητες ίσες με 1.

**Πίνακας 1. Τιμές σταθερών γινομένου διαλυτότητας, (log K).**

**Table 1. Log K values**

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ	LOGK	ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ	T (°C)
$3KAlSi_3O_8 + 2H^+ \leftrightarrow KAl_3Si_3O_{10} (OH)_2 + 6SiO_2 + 2K^+$ (Μοσχοβίτης)	-7,82	Casadevall & Omhutto, (1977)	300
$3KAlSi_3O_8 + 2H^+ \leftrightarrow KAl_3Si_3O_{10} (OH)_2 + 6SiO_2 + 2K^+$ (Μοσχοβίτης)	-8,12	Casadevall & Omhutto, (1977)	250
$3KAlSi_3O_8 + 2H^+ \leftrightarrow KAl_3Si_3O_{10} (OH)_2 + 6SiO_2 + 2K^+$ (Μοσχοβίτης)	-8,49	Casadevall & Omhutto, (1977)	200
$2FeS + S_2 \leftrightarrow 2FeS_2$ (Σιδηροπυρίτης)	-10,93	Ahmad et al., (1987)	300

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΝΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΑΝΟΡΜΟΥ-ΛΑΡΔΙΑΔΩΝ

Από την εργαστηριακή μελέτη, με τη βοήθεια του μεταλλογραφικού μικροσκοπίου και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, αναγνωρίστηκαν τα ακόλουθα στάδια ανάπτυξης της παραγένεσης:

**ΣΤΑΔΙΟ (I),** που παρατηρείται απόθεση σιδηροπυρίτη, σε ιστολογική ισοδροπία, με τα ορυκτά αρσενοπυρίτης (κ. β. % As = 46,045) + μαγνητοπυρίτης (Εξαγωνικός MC).

**ΣΤΑΔΙΟ (II),** στο οποίο παρατηρείται απόθεση τετραεδρίτη + τενναντίτη + γκολφιλντίτη (κ. β. % Te = 18,1 - 18,35).

**ΣΤΑΔΙΟ (III),** όπου αποτίθενται βιορνίτης (Κυβικός) + χαλκοπυρίτης.

**ΣΤΑΔΙΟ (IV),** στο οποίο παρατηρείται απόθεση μαυσονίτη + σταννίτη, βουλανζερίτη + βουρνονίτη + λουτσονίτη + φαματινίτη λαγγιστή + νικελίνη + γερσδορφίτη.

**ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΛΛΟΥΡΙΔΙΩΝ (V),** στο οποίο παρατηρείται απόθεση εσσίτη (Κυβικός) + στουετζίτη + καλαβερίτη + συλβανίτη + οικαδότη + βουλκανίτη + βεΐσσιτη + αλταΐτη + κρεννιερίτη + κοστοβίτη + αυτοφυών τελλονύριου (κ. β. % Te = 98,9 - 99,7) + μελονίτη + νέες συνθέσεις + περζίτης (Ορθοδομβικός).

**ΣΤΑΔΙΟ (VI),** στο οποίο παρατηρείται απόθεση γαληνίτη + αργεντίτη (Κυβικός) + μπετεκτινίτη.

**ΣΤΑΔΙΟ (VII),** στο οποίο αποτίθενται σφαλερίτης (moles % Fe < 0,044) + γκρηνοκίτης + μαγνητίτης + σιδηρίτης + σμιθσονίτης.


**ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (VIII),** στο οποίο παρατηρείται απόθεση αυτοφυούς Au (κ. β. % Au = 99,2 - 99,7) + αυτοφυούς Ag (κ. β. % Ag = 98,6 - 99) + αυτοφυούς Cu (κ. β. % Cu = 93,6) + αυτοφυούς As + στρομεγερίτη (Κυβικός) + πυραφγυρίτη

**ΥΠΕΡΓΕΝΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (IX),** όπου παρατηρείται απόθεση των ορυκτών χαλκοσίνης (Εξαγωνικός) + διγενίτης (Κυβικός) + κοβελλίνης + μπλε παραμένων κοβελλίνης + ιδαΐτης + αζουρίτης + μαλαχίτης + δελαφούσιτης + κυτρόίτης + τενορίτης + γκαιτίτης + λεπιδοκροκίτης + αιματίτης + κερουσούσιτης + αγγλεσίτης.

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ $F_{S2}$

**Στάδιο (I).** Για τη συνύπαρξη σιδηροπυρίτη και μαγνητοπυρίτη και απουσία αιματίτη, για  $T=300$  °C, η  $\log f_{S2} = -11,4$ , (Yun et al., 1996). Η συνύπαρξη σιδηροπυρίτη, αρσενοπυρίτη (46,045 % κ.β. As) και η απουσία αυτοφυούς As και τετραεδρίτη, δηλώνει για  $T = 295$  °C, τιμές  $\log f_{S2} = -11,5$  atms ως  $\log f_{S2} = -11$  atms, (Graig & Barton, 1973). Συμπεραίνουμε ένα εύρος τιμών για τη  $f_{S2}$  από  $\log f_{S2} = -11$  atms ως  $\log f_{S2} = -11,5$  atms, με μέσο όρο  $\log f_{S2} = -11,4$  atms, που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te2} = -14,7$  atms, (Shelton et al., 1990), (Εικόνες 1, 2).

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.




Εικόνα 1. Διάγραμμα  $f_{S2}$  και  $f_O2$  για τους 300 °C και 260 °C, για τα Στάδια I ως IV.

1.  $FeS_2$ : Σιδηροπυρίτης, 2.  $FeS$ : Μαγνητοπυρίτης, (εξαγωνικός- $mC$  συμμετρίας), 3.  $FeAsS$ : Αρσενοπυρίτης, 4.  $Fe_3O_4$ : Μαγνητίτης, 5.  $Fe_2O_3$ : Αιματίτης, 6. tetr: Τετραεδρίτης, 7. tn: Τενναντίτης, 8. cp: Χαλκοπυρίτης, 9. bn: Βογιώνιτης, 10. lu: Λοντσονίτης, 11. mw: Μαονούονίτης, 12.  $CaCO_3$ : Υδροθερμικό ασβεστίτης.

Figure 1.  $f_{S2}$  και  $f_O2$  diagramm, at 300 °C and 260 °C and for the Stages I to IV.

**Στάδιο (II).** Η παρουσία τετραεδρίτη, απουσία χαλκοπυρίτη και αρσενοπυρίτη, απαιτεί  $\log f_{S2} = -10,2$  atms για  $T=280$  °C, (Yun et al., 1996, So et al., 1997). Η παρουσία τενναντίτη, απουσία εναργίτη, απαιτεί  $\log f_{S2} = -10,1$  atms, για  $T=280$  °C, (Henley et al., 1984). Άρα η τιμή της  $f_{S2}$  ήταν  $\log f_{S2} = -10,1$  atms, που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te2} = -14,4$  atms, (Shelton et al., 1990), (Εικόνες 1, 2).



Εικόνα 2. Διάγραμμα  $f_{S2}$  και  $f_{Te2}$  για τους 250 °C και για τα Στάδια IV ως VI.

1. h: Εσσάρης, 2. stue: Στουεζέρης, 3. sl: Συλβανίτης, 4. me1: Μελονίτης, 5. kr: Κρεννιέριτης, 7. pz: Πεζζότης, 8. alt: Αλτανίτης, 9. Te: Αυτοφυές Τελλούριο, 10. PbS: Γαληνίτης, 11. Ag2S: Αργεντίτης, 12. Ag: Αυτοφυής Αργυρός, 13. El: Ήλεκτρο.

Figure 2.  $f_{S2}$  και  $f_{Te2}$  diagramm, at 250 °C and for the Stages IV to VI.


**Στάδιο (III).** Η συσύπαρξη βρογνίτη και χαλκοπυρίτη  $\pm$  οιδηροπυρίτη, δηλώνει  $\log f_{S2} = -9$  atms ως  $\log f_{S2} = -8$  atms για  $T=280$  °C ως  $T=270$  °C, (Imai et al., 1985, So et al., 1997), και  $\log f_{S2} = -8,5$  atms ως  $\log f_{S2} = -9,1$  atms, (Casadevall & Omhutto, 1977). Συμπεραίνουμε ότι η τιμή της  $f_{S2}$ , ήταν  $\log f_{S2} = -8,5$  atms, που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te2} = -12,8$  atms, (Zhang & Spry, 1994), (Εικόνα 2).

**Στάδιο (IV).** Ο σχηματική Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" Τμήμα Πεωλογίας Α.Π.Θ. τετραεδρίτη, απαιτεί  $\log f_{S2} = -8,3$  atms, για  $T=260$  °C, (Virke, 1985). Ο σχηματισμός μαουσονίτη  $\pm$  βρογνίτη + χαλκοπυρίτη, στους  $T=260$  °C,

απαιτεί  $\log f_{S_2} = -8,5$  atms, (Lee et al., 1975). Αρα το εύρος τιμών της  $\log f_{S_2} = -8$  atms ως -8,5 atms, με μέσο τιμή  $\log f_{S_2} = -8,3$  atms, που αντιστοιχεί σε τιμές  $\log f_{Te_2} = -12,6$  atms, (Zhang & Spry, 1994), (Εικόνες 1, 2).

**Στάδιο Τελλουριδίων (V).** Η συνύπαρξη αλταΐτη + αυτοφυνός Te ± εσσίτη για  $T=260^\circ\text{C}$ , υποδηλώνει τιμές της  $\log f_{S_2} = -9$  atms και  $\log f_{Te_2} = -6,5$  atms, (Zhang & Spry, 1994). Για τη συνύπαρξη κυβικού εσσίτη και στονετζίτη και απουσία αργεντίτη, η τιμή της  $\log f_{S_2} = -9$ , και  $\log f_{Te_2} = -6,6$  atms για  $T=250^\circ\text{C}$ , (Shelton et al., 1990). Για τη συνύπαρξη εσσίτη, μελονίτη, αλταΐτη και στονετζίτη, η  $\log f_{S_2} = -9,5$  και η  $\log f_{Te_2} = -6,6$  atms για  $T=260^\circ\text{C}$ , (Henley et al., 1984). (Εικόνα 2). Η συνύπαρξη εσσίτη, περξίτη, καλαβερίτη, στονετζίτη, συλβανίτη και κρενιερίτη, απαιτεί  $\log f_{S_2} = -9,5$  atms και  $\log f_{Te_2} = -7$  atms για  $T=260^\circ\text{C}$ , (Ahmad et al., 1987). Για τη συνύπαρξη βείσσιτη, ρικαρδίτη και βιουλκανίτη, η  $\log f_{Te_2} = -6,9$  atms για  $T=250^\circ\text{C}$ , (Simon & Essene, 1996). Συμπεραίνουμε ένα εύρος από  $\log f_{S_2} = -9$  atms ως  $\log f_{S_2} = -9,5$  atms, με μέση τιμή  $\log f_{S_2} = -9,25$  atms, ενώ για τη  $f_{Te_2}$  από  $\log f_{Te_2} = -6,5$  atms ως  $\log f_{Te_2} = -7$  atms, με μέση τιμή  $\log f_{Te_2} = -6,7$  atms, (Εικόνα 2).

**Στάδιο (VI).** Ο σχηματισμός γαληνίτη στους  $T=220^\circ\text{C}$ , απαιτεί  $\log f_{S_2} = -8$  atms, (Imai et al., 1985). Η παρουσία αργεντίτη, απουσία αυτοφυνός Ag και ήλεκτρου, απαιτεί  $\log f_{S_2} = -11$  atms, για  $T=220^\circ\text{C}$ , (Henley et al., 1984). Για τη συνύπαρξη αργεντίτη και Ag-ούχου γαληνίτη, η  $\log f_{S_2} = -11$  atms, και  $\log f_{Te_2} = -17$  atms, για  $T=220^\circ\text{C}$ , (Zhang & Spry, 1994). Συμπεραίνουμε ένα εύρος από  $\log f_{S_2} = -11$  atms ως  $\log f_{S_2} = -11,8$  atms, με μέση τιμή  $\log f_{S_2} = -11$  atms που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te_2} = -17$  atms, (Zhang & Spry, 1994), (Εικόνες 2, 3).



Εικόνα 3. Διάγραμμα  $f_{S_2}$  και  $f_O_2$  για τους  $200^\circ\text{C}$  και για τα Στάδια VI ως VIII.

1 PbS: Γαληνίτης, 2.  $\text{Ag}_2\text{S}$ : Αργεντίτης, 3.  $\text{PbSO}_4$ : Αγγλεσίτης, 4. Au: Αυτοφυνής Χρυσός, 5. Ag: Αυτοφυνής Άργυρος, 6. Cu: Αυτοφυνής Χαλκός, 7. moles FeS: Γραμμομοριακό κλάσμα Fe στον Σφαλερίτη.

Figure 3.  $f_{S_2}$  and  $f_O_2$  diagramm, at  $200^\circ\text{C}$  and for the Stages VI to VIII.

**Στάδιο (VII).** Η ταυτόχρονη παρουσία των σφαλερίτη, βουρτσίτη και μαγνητίτη και σύσταση του σφαλερίτη σε  $X_{FeS} = 0,044$  και υποδηλώνει για  $T=200^\circ\text{C}$ , τιμή της  $\log f_{S_2} = -14,5$  atms έως  $\log f_{S_2} = -14,1$  atms, που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te_2} = -16$  atms, (Craig & Scott, 1974, Henley et al., 1984). Συμπεραίνουμε ένα εύρος από  $\log f_{S_2} = -14,1$  atms ως  $\log f_{S_2} = -14,5$  atms, με μέση τιμή  $\log f_{S_2} = -14,3$  atms που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te_2} = -17,9$  atms, (Zhang & Spry, 1994), (Εικόνες 2, 3).

**Στάδιο Αυτοφυών Πολύτιμων Μετάλλων (VIII).** Η παρουσία αυτοφυνός Ag και Au, απουσία των αργεντίτη και ήλεκτρου, απαιτεί  $\log f_{S_2} = -15,3$  atms ως  $\log f_{S_2} = -15$  atms, από  $T=200^\circ\text{C}$  ως  $T=190^\circ\text{C}$ , (Henley et al., 1984), (Εικόνα 3). Συμπεραίνουμε ένα εύρος από  $\log f_{S_2} = -15$  atms ως  $\log f_{S_2} = -16$  atms, με μέση τιμή  $\log f_{S_2} = -15,5$  atms, που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te_2} = -19,5$  atms.

**Υπεργενετικό Στάδιο (IX).** Η παρουσία εξαγωνικού χαλκοσίνη και διγενίτη, σε ιστολογική ισορροπία με πλέο παραμένων κοβελλίνη στους  $T=157^\circ\text{C}$ , υποδηλώνει  $\log f_{S_2} = -10,6$  atms, (Barton Jr, 1970).

### ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ $f_{CO_2}$

Για να υπολογιστεί η τιμή της  $f_{CO_2}$  χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Casadevall & Omholtto, (1977), που υποθέτει ότι το υδροθερμικό οξειστό συμπεριφέρεται ως ιδανικό μίγμα στο σύστημα  $\text{NaCl}-\text{CO}_2-\text{H}_2\text{O}$ . Η  $f_{CO_2}$  υπολογίζεται από την εξισώση  $R = f_{CO_2} X_{CO_2}$ , οπου  $X_{CO_2}$  είναι το γραμμομοριακό κλάσμα του  $\text{CO}_2$  στο ρευστό

όπως υπολογίζεται από τα θεωρητικά τιμές για το  $X_{CO_2}$ ,  $X_{CO_{2min}} = 0,0405$  και  $X_{CO_{2max}} = 0,0893$ . Για  $T = 190^\circ C$  η  $K = 4700$ , ενώ για  $T = 300^\circ C$  η  $K = 4300$ , για διαλύματα 0,25 m ως 1 m, (NaCl). Βάσει των παραπάνω δεδομένων υπολογίζεται ότι η  $\log f_{CO_2}$  κυμαίνονται από  $\log f_{CO_2} = -0,2$  ως  $\log f_{CO_2} = 0,8$ , τιμές που αντιστοιχούν σε μερική πίεση 0,5 atm και 5,3 atm.

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ $a_{S_2}$

**Στάδιο (I).** Από την ισορροπία, για τους σιδηροπυρίτη και μαγνητοπυρίτη,  $2FeS + S_2 \rightleftharpoons 2FeS_2$ , (Ahmad et al., 1987), για  $\log K = -10,93$ ,  $pH = 5,7$ ,  $T = 300^\circ C$ , υπολογίζεται  $\log a_{S_2} = -10,9$ .

**Στάδιο (II).** Η συνύπαρξη τετραεδρίτη και τενναντίτη, απουσία χαλκοπυρίτη, φαματινίτη και εναργίτη, απαιτεί  $\log a_{S_2} = -9$ , για  $T = 280^\circ C$ , που αντιστοιχεί σε  $\log a_{O_2} = -33,5$  και  $pH = 5,3$ , (Barnes, 1979).

**Στάδιο (III).** Η συνύπαρξη βορνίτη και χαλκοπυρίτη ± σιδηροπυρίτη, για  $T = 275^\circ C$ , δηλώνει  $\log a_{S_2} = -7,5$ , και  $\log a_{O_2} = -34$  (Barnes, 1979).

**Στάδιο (IV).** Η παρουσία βουλανζερίτη, απαιτεί  $\log a_{S_2} = -8,5$ , για  $T = 260^\circ C$ , που αντιστοιχεί σε  $\log a_{O_2} = -34,5$ , (Graig & Barton, 1973).

**Στάδιο Τελλουριδίων (V).** Η συνύπαρξη αλταΐτη, αυτοφυούς Te, εσσίτη, στονετζίτη, μελονίτη, περζίτη, καλαβερίτη, συλβανίτη και κρεννιερίτη, απουσία αργεντίτη, για  $T = 255^\circ C$ , δηλώνει  $\log a_{Te_2} = -6,5$  atm που αντιστοιχεί σε  $\log a_{S_2} = -10,3$ , (Drabek & Moh, 1995).

**Στάδιο (VI).** Η παρουσία αργεντίτη και γαληνίτη, απουσία αυτοφυούς Ag υποδηλώνει  $\log a_{S_2} = -12,3$ , για  $T = 220^\circ C$ , (Graig & Barton, 1973).

**Στάδιο (VII).** Για τη συνύπαρξη σφαλερίτη, βουρτσίτη, μαγνητίτη και σύσταση του σφαλερίτη σε  $X_{FeS} = 0,044$ , υπολογίζεται ότι  $\log a_{S_2} = -13,9$ , για  $T = 200^\circ C$ , που αντιστοιχεί σε  $\log a_{O_2} = -39$  και  $\log a_{FeS_2} = -1,7$ , (Choi et al., 1998).

**Στάδιο Αυτοφυών Πολυτίμων Μετάλλων (VIII).** Η συνύπαρξη των αυτοφυών Cu, Au, Ag και As, απουσία αργεντίτη, εσσίτη και ήλεκτρου απαιτεί, για  $T = 195^\circ C$ ,  $\log a_{S_2} = -13,65$ , που αντιστοιχεί σε  $\log a_{O_2} = -41$  και  $pH = 6$ , (Graig & Barton, 1973, Drabek & Moh, 1995).

**Υπεργενετικό Στάδιο (IX).** Η συνύπαρξη εξαγωνικού χαλκοσίνη και διγενίτη σε ιστολογική ισορροπία με μπλε παραμένων κοβελλίνη, σε  $T = 150^\circ C$ , υποδηλώνει  $\log a_{S_2} = -10,5$ , (Barnes, 1979).

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ $f_{O_2}$ KAI $pH$

Για τον ανεξάρτητο προσδιορισμό της τιμής του pH, χρησιμοποιήθηκε η ισορροπία μοσχοβίτη και αλβίτη, από τη συνύπαρξη των ορυκτών στη ζώνη εξαλλούσωσης. Από την ισορροπία, (Casadevall & Omhoto, 1977, Cooke et al. 1996),  $3KAlSi_3O_8 + 2H^+ \rightleftharpoons [KAl_3Si_3O_10(OH)_2] + 6SiO_2 + 2K^+$ , για  $\log K = -7,82$ ,  $T = 300^\circ C$  και  $[K^+] = 1,7 \cdot 10^{-2}$ , υπολογίζουμε  $[H^+] = 10^{-5,54}$ , δηλαδή  $pH = 5,54$ , (Στάδιο I). Από την ίδια ισορροπία, για  $\log K = -8,12$ ,  $T = 250^\circ C$  και  $[K^+] = 1,7 \cdot 10^{-2}$ , υπολογίζουμε  $[H^+] = 10^{-5,62}$ , δηλαδή  $pH = 5,62$ , (Στάδιο V). Ομοίως, για  $\log K = -8,49$ ,  $T = 200^\circ C$  και  $[K^+] = 1,7 \cdot 10^{-2}$ , υπολογίζουμε  $[H^+] = 10^{-5,94}$ , δηλαδή  $pH = 5,94$ , (Στάδιο VIII), (Εικόνα 4).


**Στάδιο (I).** Η συνύπαρξη σιδηροπυρίτη και μαγνητοπυρίτη δηλώνει  $\log f_{O_2} = -33,5$  atm ως  $\log f_{O_2} = -34$  atm για  $T = 295^\circ C$ . Άρα η τιμή του  $pH = 5,5$ , (So et al., 1997), (Εικόνα 4).

**Στάδιο (II).** Η συνύπαρξη τετραεδρίτη και τενναντίτη, απουσία εναργίτη, φαματινίτη χαλκοπυρίτη και βορνίτη, απαιτεί  $\log f_{O_2} = -32,8$  atm, για  $T = 280^\circ C$ , (Imai et al., 1985). Άρα η τιμή του  $pH = 5,3$ , (Virke, 1985), (Εικόνα 4).

**Στάδιο (III).** Η συνύπαρξη χαλκοπυρίτη και βορνίτη, απαιτεί  $\log f_{O_2} = -32,1$  atm, για  $T = 275^\circ C$ , (Casadevall & Omhoto, 1977, Virke, 1985). Άρα η τιμή του  $pH = 5,2$ , (Εικόνα 4).

**Στάδιο (IV).** Η παρουσία φαματινίτη, απουσία τετραεδρίτη, απαιτεί  $\log f_{O_2} = -32,3$  atm, ως  $\log f_{O_2} = -32,4$  atm, για  $T = 260^\circ C$ , (Imai et al., 1985, Virke, 1985). Άρα για το Στάδιο IV, η τιμή του  $pH = 4,9$  ως  $pH = 5$ , (Εικόνα 4).


**Στάδιο Τελλουριδίων (V).** Στο Στάδιο V, για  $T = 260^\circ C$ , για τιμές των  $\log f_{Te_2} = -6,7$  atm και  $\log a_{S_2} = -9,25$  atm, για  $\log \Sigma S = -3$  ως  $\log \Sigma S = -2$  και  $\log \Sigma C = -1$  ως  $\log \Sigma C = 1$ , η τιμή της  $\log f_{O_2} = -35,4$  atm, που αντιστοιχεί σε τιμή του  $pH = 5,6$  (Shelton et al., 1990). Επίσης για τιμές των  $\log f_{Te_2} = -6,7$  atm,  $\log f_{O_2} = -35,4$  atm στους  $T = 260^\circ C$ , ως  $\log f_{O_2} = -34,8$  atm στους  $T = 250^\circ C$  και  $pH = 5,6$ , το κυρίαρχο ιόν που μεταφέρει και αποθέτει τα τελλουρίδια είναι το  $HTe^-$ , (Mc Phail, 1995, Simon & Essene, 1996), (Εικόνα 5).



Εικόνα 4. Διάγραμμα  $fo_2$  και  $pH$ , για τους  $300^\circ C$  και  $260^\circ C$ , για τα Στάδια I ως IV.

1.  $FeS_2$ : Σιδηροπυρίτης, 2.  $FeS$ : Μαγνητοπυρίτης (εξαγωνικός- $mC$  συμμετρίας), 3.  $Fe_3O_4$ : Μαγνητίτης, 5. tetr: Τετραεδρίτης, 6. cp: Χαλκοπυρίτης, 7. bn: Βορνίτης, 8. fam: Φαματινίτης, 9.  $H_2S$ : Υδρόθειο, 10.  $H_2CO_3$ : Ανθρακικό οξύ, 11. cc: Υδροθειμικός ασβεστίτης, 12. musc: Μοσχοβίτης, 13. Milky qtz: Γαλακτόχρωμος Χαλαζίας.

Figure 4.  $fo_2$  and  $pH$  diagramm, at  $300^\circ C$  and  $260^\circ C$  for the Stages I to IV.




Εικόνα 5. Διάγραμμα  $fo_2$  και  $pH$ , για τους  $250^\circ C$  και για τα Στάδια V, VI. 1. hessite: Εσσίτης, 2. musc: Μοσχοβίτης, 3. K-spar: Κ-ούχος άστριος.

Figure 5.  $fo_2$  and  $pH$  diagramm, at  $250^\circ C$  and for the Stages V to VI.

**Στάδιο (VI).** Η απόθεση γαληνίτη απονοία αγγλεσίτη, για  $T=210^\circ C$ , απαιτεί  $\log f_{O_2} = -34$  atm, (Barton Jr., 1970). Η συνύπαρξη κυβικού αργεντίτη και γαληνίτη, απονοία αυτοφυούς Ag και εσσίτη που αντιστοιχεί σε  $\log f_{Te_2} = -17$  atm, για  $T=220^\circ C$ , απαιτεί  $\log f_{O_2} = -33.4$  atm, (Zhang & Spry, 1994). Άρα το Στάδιο VI, για  $\log f_{O_2} = -33.7$  atm, η τιμή του  $pH=5.7$ , (Εικόνα 5).

**Στάδιο (VII).** Η συνύπαρξη των σφαλερίτη, βουρτσίτη και μαγνητίτη, για  $\log f_{S_2} = -14.3$  atm και σύσταση των σφαλερίτη σε  $X_{FeS} = 0.044$ , δηλώνει για  $T=210^\circ C$ , η  $\log f_{O_2} = -39$  atm, (Scott & Barnes, 1971, Graig & Scott, 1974). Άρα η τιμή του  $pH=5.8$ , (Εικόνα 6).



Εικόνα 6. Διάγραμμα  $\log f_{\text{O}_2}$  και  $\text{pH}$ , για τους  $200^{\circ}\text{C}$  και για τα Στάδια VII, VIII. 1. musc: Μοσχοβίτης, 2. Clear qtz: Γκρίζος Χαλαζίας, 3.  $\text{H}_2\text{S}$ : Υδρόθειο.

Figure 6.  $\log f_{\text{O}_2}$  and pH diagramm, at  $200^{\circ}\text{C}$  and for the Stages VII to VIII.

**Στάδιο Αυτοφυών Πολυτίμων Μετάλλων (VIII).** Η παρουσία αυτοφυούς Cu για  $\log f_{\text{S}_2} = -15.6$  atmς και  $T = 195^{\circ}\text{C}$ , αντιστοιχεί σε  $\log f_{\text{O}_2} = -40$  atmς, που ισοδυναμεί σε  $\text{pH} = 6$ . Επίσης η παρουσία πυραγγυρίτη για  $\log f_{\text{S}_2} = -15.6$  atmς, στους  $T = 195^{\circ}\text{C}$ , απαιτεί  $\log f_{\text{O}_2} = -40$  atmς, που αντιστοιχεί σε  $\text{pH} = 6$ , (Shelton et al., 1990). Συμπέρανουμε ότι η  $\log f_{\text{O}_2} = -40$  atmς, που αντιστοιχεί σε  $\text{pH} = 6$ , (Εικόνα 6).

**Υπεργενετικό Στάδιο (IX).** Η συνύπαρξη χαλκοσίνη, διγενίτη, κοβελλίνη και μπλε παραμένων κοβελλίνη, στους  $T = 157^{\circ}\text{C}$  για  $\log f_{\text{S}_2} = -10.6$  atmς, είναι εφικτή για  $\text{pH} = 6.9$ , (Graig & Scott, 1973).

**Πίνακας 2. Παράμετροι υδροθερμικού ρευστού περιοχής Πανόρμου-Λαρδιάδων για τα Στάδια I ως V. 1.**

Param.: Υπολογιζόμενοι παράμετροι υδροθερμικού ρευστού, 2. Stage: Στάδιο μεταλλοφορίας, 3. N.P.I.: Όχι εφικτός ο υπολογισμός.

Table 2. Parameters of the hydrothermal fluid in Panormos - Liardades area.


Param.	Stage I	Stage II	Stage III	Stage IV	Stage V	Stage VI	Stage VII	Stage VIII	Stage IX
T °C	299-290	289-280	279-270	269-260	265-230	235-220	219-200	199-190	189-153
$\log f_{\text{S}_2}$	-11, 4	-10, 1	-8, 5	-8, 3	-9, 25	-11	-14, 3	-15, 5	-10, 6
$\log f_{\text{Te}_2}$	-14, 7	-14, 4	-12, 8	-12, 6	-6, 7	-17	-17, 9	-19, 5	N.P.I.
$\log a_{\text{S}_2}$	-11	-9	-7, 5	-8, 5	-10, 3	-12, 3	-13, 9	-13, 65	-10, 25
$\log f_{\text{O}_2}$	-33, 75	-32, 9	-32, 1	-32, 35	-35, 4	-33, 7	-39	-40	-42
$\log a_{\text{O}_2}$	-33	-33, 5	-34	-34, 5	N.P.I.	N.P.I.	-39, 5	-41	N.P.I.
pH	5, 5	5, 3	5, 2	4, 95	5, 6	5, 7	5, 85	6	6, 9

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει της μεθόδου ισοδροπιών, υπολογίστηκαν οι διακυμάνσεις, των ακόλουθων παραμέτρων του διαλύματος, (Πίνακες 2, 3): α)  $f_{\text{S}_2}: 10^{-8.3}-10^{15.5}$ , β)  $f_{\text{Te}_2}: 10^{-6.73}-10^{19.5}$ , γ)  $f_{\text{O}_2}: 10^{-32.1}-10^{-42}$ , δ)  $f_{\text{CO}_2}: 10^{-0.8}-10^{-0.2}$ , ε)  $a_{\text{S}_2}: 10^{-7.5}-10^{13.9}$ , στ)  $a_{\text{Te}_2}: 10^{-6.5}$  και ζ) pH: 4.95-6.9.

Οι  $f_{\text{S}_2}$  και  $a_{\text{S}_2}$  παρουσιάζουν συνεχή αύξηση από το Στάδιο I έως το IV, ακολουθώς παρουσιάζουν απότομη μείωση στο Στάδιο V και συνεχή μείωση από το Στάδιο VI έως το VIII. Η  $f_{\text{Te}_2}$  παρουσιάζει συνεχή αύξηση από το Στάδιο I έως το IV, απότομη αύξηση στο Στάδιο V και συνεχή μείωση από το Στάδιο VI έως το VIII. Η  $f_{\text{O}_2}$  παρουσιάζει αύξηση από το Στάδιο I έως το III, και συνεχή μείωση από το Στάδιο IV έως το IX, που γίνεται εντονότερη στα τελικά Στάδια VII και VIII. Η  $a_{\text{O}_2}$  παρουσιάζει συνεχή μείωση σε όλα τα στάδια. Τέλος το Ph, παρουσιάζει αύξηση, στα Στάδια I έως IX, με τιμή 4.95 - 6.9, με αποτέλεσμα το διάλυμα να μεταβαίνει από ελαφρώς οξύνο προς ουδέτερο.

Οι σημαντικές μεταβολές στις φυσικοχημικές συνθήκες που παρατηρούνται στο Στάδιο V, οφείλονται στο Α' επεισόδιο βρασμού ψηφιακή βιρτουότητας "Θεόφραστος" Τρήμα Γεωλόγιας. Α.Π.Θ. μεταβολές στο Στάδιο VIII στο Β' επεισόδιο βρασμου που υπέστει το ρευστό στους  $190^{\circ}\text{C}$ , (Εικόνα 7).



Εικόνα 7. Συμπερασματικό διάγραμμα μεταβολής των φυσικοχημικών παραμέτρων του μεταλλοφόρου ρευστού κατά την εξέλιξη της μεταλλοφορίας της περιοχής Πανόρμου-Λαοδιάδων, στην Τήνο. 1.  $f_{S_2}$ : Διαφυγότητα Θείου, 2.  $f_{O_2}$ : Διαφυγότητα Οξυγόνου, 3.  $f_{Te_2}$ : Διαφυγότητα Τελλουρίου.

Figure 7. Conclusive diagram for the evolution of the physicochemical parameters of the hydrothermal fluid, in the Panormos - Liardiades area.

## ΒΙΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

- AHMAD, M., SOLOMON, M., & WALSHE, J.L., 1987. Mineralogical and geochemical studies of the Emperor Gold-Telluride Deposit, Fiji: ECONOMIC GEOLOGY, 87, 345-370.
- BARNES, L. H., 1979. Geochemistry of hydrothermal ore deposits: Sec. Edit. John Wiley and Sons inc., New York, 800 pp.
- BARTON, P. B., Jr., 1970. Sulfide petrology: Miner. Soc. Amer. Spec. Pap., 3, 187-198.
- CASADEVALL, T., & OHMOTO, H., 1977. Sunnyside Mine, Eureka Mining District, San Juan Country, Colorado: Geochemistry of gold and base metal ore deposition in a volcanic environment: ECONOMIC GEOLGY, 72, 1285-1320.
- CHOI, S. H., SO, C. S., YUN, S. J., & SHELTON, K., 1998. Geochemistry and genesis of the hydrothermal Cu deposits in the Gyeongsang Basin, Korea, Masan mineralized area: N. Jb. Miner. Abh., 173, 189-206.
- COOKE, R., Mc PHAIL, D., & BLOOM, M., 1996. Epithermal gold mineralization, Acupan, Baguio district, Philippines: Geology, mineralization, alteration and the thermochemical environment of ore deposition: ECONOMIC GEOLOGY, 94, 243-272.
- CRAIG J., R., & SCOTT, S. D., 1974. Sulfide phase equilibria: Min. Soc. of America. Short Course Notes, Sulfide Mineralogy, 1, 1-57.
- DRABEK, M., & MOH, G. H., 1995. The Pb-Sn-Te-S system and its geological applications: N. Jb. Miner. Abh., 169, 267-272.
- GRAIG, J. R., & BARTON, P. B. Jr., 1973. Thermochemical approximations for Sulfosalts. ECONOMIC GEOLOGY, 68, 498-506.
- HENLEY R.W., TRUESELL, H. A., WHITNEY, J.A., & BARTON, P. B. Jr. 1984. Fluid-mineral equilibria in hydrothermal systems: Ed. Robertson J., Rev. ECONOMIC GEOLOGY, 1, 267.
- IMAI H., KAWASAKI M., YAMAGUCHI M., & TAKAHASHI M., 1985. Mineralization and paragenesis of the Huancala mine, C. Peru: ECONOMIC GEOLOGY, 80, 461-478.
- LEE, M.S., TAKENOUCHI, S., & IMAI H., 1975. Syntheses of stannoidite and mawsonite and their genesis in ore deposits: ECONOMIC GEOLOGY, 59, 834-843.
- MASTRAKAS, N., & SEYMOUR, St. K., 2000. Geochemistry of Tinos granite: A window to the Miocene micropalaeotectonics of the Aegean region: N. Jb. Miner. Abh. 175, 295-315.
- MC PHAIL, C.D., 1995. Thermodynamic properties of aqueous Tellurium species between 25 and 300 °C: Geoch. Et Cosmoch. Acta, 59, 851-866.
- SCOTT, S., D., & BARNES, H., L., 1971. Sphalerite geothermometry and geobarometry: ECONOMIC GEOLOGY, 66, 653-669.
- SHELTON, L.K., SO, C.S., HAEUSSERG, T., CHI, S. J., & LEE, K.Y., 1990. Geochemical studies of the Tongyoung Gold-Silver deposits, Republic of Korea: Evidence of meteoric water dominance in a Te-bearing epithermal system: ECONOMIC Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος" - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

- SIMON G., & ESSENE J. E., 1996. Phase relations among selenides, sulfides, tellurides and oxides: I. Thermo-dynamic properties and calculated equilibria: ECONOMIC GEOLOGY, 91, 1183-1208.
- SO, C. S., CHOI, S. H., & SHELTON, L.K., 1997. Geochemistry and genesis of hydrothermal Cu deposits in the Gyeongsang Basin (Andong Area), Korea: A link between porphyry and epithermal systems: N. Jb. Miner. Abh., 171, 281-307.
- VIRKE G. P., 1985. Precious metal vein systems in the national district Humboldt Country, Nevada: ECONOMIC GEOLOGY, 80, 360-393.
- YUN, S. T., CHOI, S. H., & SO C. S., 1996. Complex geochemical evolution of the hydrothermal fluids related to Cu-Zn-Pb mineralization of the Namseon Mine, Gyeongsang Sedimentary Basin, Korea: N. Jb. Miner. Abh., 171, 281-307.
- ZHANG, X., & SPRY, P., 1994. Petrological, mineralogical, fluid inclusions and stable isotopes studies of the Gies gold-silver telluride deposit, Judith Mountains, Montana: ECONOMIC GEOLOGY, 89, 602-627.