

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΒΔ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Η. Μαριολάκος, Ε. Λέκκας, Γ. Δανάμος, Ε. Λόγος, Ι. Φουντούλης και Ε. Αδαμοπούλου

ΣΥΝΟΨΗ

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τη λεπτομερή γεωλογική- νεοτεκτονική χαρτογράφηση κλίμακας 1:10.000, τις νεοτεκτονικές μετρήσεις και παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, δίδουν τη δυνατότητα μιας νέας ερμηνείας της νεοτεκτονικής εξέλιξης της χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ. Πελοπόννησος).

Συγκεκριμένα διαπιστώνεται, ότι με βάση την θέση και την παραμόρφωση ορισμένων χαρακτηριστικών σχηματισμών υπάρχουν έντονες ανοδικές κινήσεις μέσα στο Ολόκαινο οι οποίες παίζουν σημαντικότατο ρόλο στις μορφογενετικές διεργασίες.

ABSTRACT

The new data from the detailed geological, neotectonic mapping, in scale 1:10.000, the neotectonic measurements and observations in combination with the already existing data give us the opportunity for a new interpretation of the neotectonic evolution of the Kyllini peninsula (NW. Peloponnesus, Greece). Actually, based on the position and the deformation of certain characteristics formations it is ascertained that uplifting movements took place during the Holocene. These movements determine the morphogenetic processes.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χερσόνησος της Κυλλήνης και γενικότερα η Δυτική Πελοπόννησος στο σύνολό της, μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν μία από τις πιο ενεργές τεκτονικά περιοχές της χώρας. Ο κυριότερος λόγος της έντονης νεοτεκτονικής δραστηριότητας είναι ότι η περιοχή ευρίσκεται προς το εξωτερικό τμήμα του Ελληνικού τόξου και κοντά στο όριο σύγκλισης των δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της Αφρικανικής που βρίσκεται προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά και υποβυθιζεται και της Ευρωπαϊκής, που βρίσκεται προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά και επωθείται. Το όριο σύγκλισης των δύο λιθοσφαιρικών πλακών έχει γενική διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ, στο συγκεκριμένο τμήμα, διέρχεται δυτικά των νήσων Ζακύνθου -Κεφαλλονιάς και εκφράζεται μορφολογικά με την τάφρο του Ιονίου ιδιαίς γενικής διεύθυνσης.

I. MARIOLAKOS - E. LEKKAS - G. DANAMOS - E. LOGOS - I. FOUNTOULIS - E. ADAMOPOULOU,
Neotectonic evolution of the Kyllini peninsula (NW. Peloponnesus).

University of Athens, Dept. of Geology, Dynamic Tectonic Applied Geology, Panepistimioupolis, Zografou,
157 84 Athens, Greece.

Αποτέλεσμα των έντονων νεοτεκτονικών διεργασιών που εκφράζονται από την παρατηρούμενη πολυπλοκότητα, ως προς την κατακόρυφη και οριζόντια έννοια, της λιθοστρωματογραφίκης διάρρωσης των Μεταλπικών σχηματισμών είναι και η εκδήλωση πολλών και μεγάλων σεισμών στην ευρύτερη περιοχή, με πλέον αντιπροσωπευτικό τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 μεγέθους $M_L = 5.5$ R ο οποίος προκάλεσε και σημαντικές καταστροφές. Με αφορμή την τελευταία αυτή σεισμική δόνηση και στα πλαίσια ενός εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος, που μας ανέθεσε ο Ο.Α.Σ.Π. μας δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουμε με λεπτομέρεια την γεωλογία και την τεκτονική-νεοτεκτονική της περιοχής και να αναθεωρήσουμε πολλές από τις υφιστάμενες απόψεις για τη νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου της Κυλλήνης.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Με βάση τα υφιστάμενα βιβλιογραφικά δεδομένα οι γεωλογικοί σχηματισμοί, οι οποίοι εμφανίζονται στο γεωγραφικό χώρο της χερσονήσου της Κυλλήνης είναι δυνατό να διακριθούν σε δύο κατηγορίες, τους Αλπικούς οι οποίοι υπόκεινται και αποτελούν το υπόβαθρο και τους Μεταλπικούς οι οποίοι υπέρκεινται και καλύπτουν ασύμφωνα τους πρώτους.

Οι Αλπικοί σχηματισμοί της περιοχής ανήκουν στην ίσια Ενότητα (AUBOUIN 1959, AUBOUIN & DER COURT 1962, SAVOYAT 1977 κ.α.) που μαζί με τις εμφανίσεις του Αράξου (ΤΣΟΦΛΙΑΣ, 1977) αποτελούν και τις μοναδικές εμφανίσεις της ενότητας στην Πελοπόννησο. Οι Αλπικοί σχηματισμοί διακρίνονται: (i) σε εραπορίτες οι οποίοι έχουν ηλικία Τριαδικό (ESSO 1962, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, 1971) μεγάλο πάχος και εμφανίζονται δυτικά του χωριού Κάστρο, και (ii) σε Ασβεστολίθους οι οποίοι έχουν ηλικία Ανώτερα Κρητιδικό-Ηώκαινο κατά τους AUBOUIN & DER COURT (1962), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1967, 1969, 1971) και εμφανίζονται στο χωριό Κάστρο.

Οι Μεταλπικοί σχηματισμοί της χερσονήσου της Κυλλήνης εμφανίζονται στο μεγαλύτερο τμήμα της, και η ηλικία της βάσης των είναι κατά τον PHILIPPSON (1892) Κατώτερο Πλειόκαινο, κατά δε τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (1971) Μέσο Πλειόκαινο. Αποτελούνται από μια επαλληλία στρωμάτων, άμμων, ψαμμιτών, κροκαλοπαγών, αργίλων, μαργαρών που αποτέλησαν σε διάφορα περιβάλλοντα (θαλάσσιο, υφάλμυρο, ποτάμιο, χερσαίο, κτλ.) ενώ το συνολικό τους πάχος προς τα ανατολικά της περιοχής υπερβαίνει τα 1000 μέτρα. (ESSO 1962, ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1987, κα.)

Οι Αλπικοί σχηματισμοί συγκροτούν σε γενικές γραμμές μία αντικλινική δομή γενικής διεύθυνσης Β-Ν της οποίας ο άξονας διέρχεται περίπου από το χωριό Κάστρο (HAGEMAN 1977, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1987) όπου εμφανίζεται και το κορυφαίο της, ενώ προς τα δυτικά και τα ανατολικά σχηματίζουν αντίστοιχες συγκλινικές δομές ιδίας γενικής διεύθυνσης.

Εξάλλου πολλοί ερευνητές στηρίζονται σε λιθοστρωματογραφικά, τεκτονικά και γεωφυσικά δεδομένα καθώς επίσης και σε δεδομένα γεωτρήσεων μεγάλου βάθους, έχουν κατά καιρούς διατύπωσει διάφορες απόψεις για την νεοτεκτονική εξέλιξη της χερσονήσου.

Πιο συγκεκριμένα οι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, 1971, WINTER 1979, KOWALCZYK & WINTER 1979, SCHMIDT 1984, ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1987, κα. δέχονται ότι ο γεωγραφικός χώρος της χερσονήσου της Κυλλήνης από το Μέσο Μειόκαινο ως το Κατώτερο Πλειόκαινο έχει αναδυθεί με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αντίστοιχης ηλικίας ιζήματα. Αντίθετα γειτονικές περιοχές όπως ο διαυλός Κυλλήνης-Ζακύνθου, Κόλπος Χειλωνίτη, περιοχή Πύργου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ευρίσκοντο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντίστοιχα ιζήματα (MITZOPOULOS 1940, ESSO 1962, HAGEMAN 1977, ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1987 κ.α.). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι υπήρχε έντονο ανάγλυφο που προήλθε είτε από την τελική παροξυσμική φάση που πήγε στους σχηματισμούς της Ιονίου ενότητας κατά το Ακουτάνιο-Βουρδιγάλιο (AUBOUIN 1959, SAVOYAT 1977) είτε από τον διαπειρισμό των εραποριτών (ESSO 1962, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1971, KOWALCZYK & WINTER 1979, HAGEMAN 1977).

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε από το Κατώτερο-Μέσο Πλειόκαινο ως το Κατώτερο-Μέσο Πλειστόκαινο (με ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων ερευνητών) η χερσόνησος της Κυλλήνης και η ευρύτερη περιοχή μετατράπηκε σε μία αβαθή παράκτια περιοχή (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1971, 1970, HAGEMAN 1977, KOWALCZYK & WINTER 1979, SCHMIDT 1984, ΚΑΜΠΕΡΗΣ 1987) με ιζηματογένεση κλαστικών σχηματισμών.

Κατά το Ανώτερο Πλειόκαινο-Κατώτερο Πλειστόκαινο έλαβαν χώραν διαπειρικές κινήσεις (HAGEMAN 1977) οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να ανυψωθεί η περιοχή της χερσονήσου της Κυλλήνης και στη συνέχεια (Μέσο Πλειστόκαινο-Ολόκαινο) να διαμορφωθεί σταδιακά η σημερινή μορφολογική εικόνα εξ αιτίας της διάρρωσης.

Αντίθετα οι WINTER (1979), KOWALCZYK & WINTER (1979) θεωρούσαν ότι οι διαπειρικές κινήσεις συνεχίσθηκαν και στο Μέσο Πλειστόκαινο οπότε η χερσόνησος μετατράπηκε συσαστικά σε μία νήσο στην περιφέρεια της οποίας έλαβε χώρα η ιζηματογένεση χαρατηριστικών σχηματισμών του Τυρρηνίου ενώ στο Ολόκαινο η περιοχή ανυψώθηκε ελάχιστα και παράλληλα συνδέθηκε με την υπόλοιπη χέρσος εξ αιτίας της πλήρωσης της περιοχής Βαρθολομείου - Γαστούνης από πρόσφατες αποθέσεις.

Τέλος οι UNDERHILL (1985, 1988) και ΚΑΜΠΕΡΗΣ (1987) δέχονται ότι τα φαινόμενα διαπειρισμού πιθανώς να συνεχίσθηκαν και κατά το Πλειστόκαινο-Ολόκαινο.

II. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σαν πρώτος και βασικός στόχος που τέθηκε, ήταν να γίνει χαρτογράφηση σε δύο την χερσόνησο της Κυλλήνης, έτσι ώστε να αποκτηθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα της γεωλογικής-νεοτεκτονικής δομής της περιοχής. Η χαρτογράφηση έγινε πάνω σε τοπογραφικό υπόβαθρο κλίμακας 1:10.000, το οποίο είχε προέλθει από κατάλληλη σμίκρυνση των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. Η επιλογή της κλίμακας αυτής έγινε αφ' ενός διότι παρέχει ικανοποιητική ακρίβεια, αφ' ετέρου διότι προσφέρει μια εποπτική εικόνα δύοτε της περιοχής. Η τελική παρουσίαση του χάρτη γίνεται υπό σμίκρυνση στην Εικόνα 1.

Κατά τη χαρτογράφηση ακολουθήθηκε μία ιδιαίτερη μεθοδολογία, κύριοι άξονες της οποίας ήταν οι ακόλουθοι:

α. Η διάκριση σχηματισμών οι οποίοι περιλαμβάνουν πετρώματα ή τύπους πετρώματων με συγκεκριμένη ηλικία και σημασία στη γεωλογική δομή και στη νεοτεκτονική εξέλιξη.

β. Η ακριβής αποτύπωση των ορίων των σχηματισμών και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των στοιχείων τους (κλίση, διεύθυνση κτλ.).

γ. Η ακριβής αποτύπωση των ρηγμάτων και η καταγραφή των στοιχείων τους.

δ. Η ακριβής αποτύπωση των ορίων και η καταγραφή των στοιχείων ορισμένων σχηματισμών που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη γεωμετρία, η παραμόρφωση των οποίων είναι ενδεικτική των πρόσφατων τεκτονικών κινήσεων.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ


Με βάση τα δεδομένα της χαρτογράφησης στην περιοχή της χερσονήσου της Κυλλήνης εμφανίζονται οι ακόλουθοι σχηματισμοί:

A. ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι Αλπικοί σχηματισμοί αποτελούν το υπόβαθρο, ανήκουν στην ίσια Ενότητα και είναι οι ακόλουθοι:

α. Εβαπορίτες Κάστρου: Πρόκειται για γύψους, χρώματος σκούρου που οφείλεται στην παρουσία βιτουμενίων και κατά θέσεις λευκού-υπόλευκου, οι οποίοι είναι κατακερματισμένοι. Η ηλικία τους είναι πιθανότατα Τριαδικό (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 1969) και η εμφάνισή τους οφείλεται σε φαινόμενα διαπειρισμού. Εμφανίζονται 500 μέτρα δυτικά του χωριού Κάστρου ενώ μικρότερες σποραδικές εμφανίσεις υπάρχουν και προς τα βορειοδυτικά της κύριας εμφάνισης (Εικ. 2).

β. Ασβεστόλιθοι Κάστρου: Πρόκειται για λευκούς-υπόλευκους λεπτοστρωματώδεις και κατά θέσεις μεσοστρωματώδεις που περιέχουν κονδύλους silex. Η ηλικία τους είναι πιθανότατα Κρητιδικό (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 1967, 1969) ενώ το ορατό πάχος τους υπερβαίνει τα 150 μέτρα. Εμφανίζονται κυρίως στο χωριό Κάστρο και στην περιοχή βρέσια των λουτρών της Κυλλήνης, ενώ



Εικ. 1. Γεωλογικός χάρτης της χερσονήσου της Κυλλήνης. 1: Θίνες, 2: Beach rocks, 3: Παράκτιες αποθέσεις, 4: Πλευρικά κορήματα, 5: Άλλουσια, 6: Σχηματισμός Γλώσσας, 7: Σχηματισμός Λυγιάς, 8: Σχηματισμός Ψηλής Ράχης, 9: Σχηματισμός ασβεστολιθών Κάστρου, 10: Σχηματισμός Εβαποριτών Κάστρου, 11: ρήγμα, 12: κλίση-διεύθυνση στρωμάτων. (Βασισμένος στους χάρτες των CHRISTODOULOU 1969, KOWALCZYK & WINTER 1979 με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις).

Fig.1. Geological map of Kyllini peninsula. (Based on the maps of CHRISTODOULOU 1969, KOWALCZYK & WINTER 1979 with some changes and completions). 1: Dunes, 2: Beach rocks, 3: Coastal deposits, 4: Scree, 5: Alluvial deposits, 6: Glossa Formation, 7: Lygia formation, 8: Psili Rachi Formation, 9: Kastro limestones, 10: Kastro evaporites Formations, 11: fault, 12: strike and dip of strata.

μικρότερες σποραδικές εμφανίσεις υπάρχουν και βορειοδυτικά του Κάστρου. Αποτελούν τον υπερκιμένο σχηματισμό των εβαποριτών.

Β. ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι Μεταλπικοί σχηματισμοί εμφανίζονται στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής και καλύπτουν ασύγκρινα τους Αλπικούς σχηματισμούς. Οι Μεταλπικοί σχηματισμοί είναι οι ακόλουθοι από τους αρχαιότερους προς τους νεώτερους.

α. Σχηματισμός Κροκαλοπαγών Ψηλής Ράχης: Αποτελούν τον κατώτερο σχηματισμό (σχηματισμός βάσης) που απαντά στην περιοχή. Περιλαμβάνει κροκάλες κυρίως κερατολιθικές αλλά και ασβεστολιθικές, οι οποίες παρουσιάζουν κακή κοκκωμετρική ταξινόμηση. Πρόκειται για υλικά ποτάμιας προέλευσης που επεξεργάσθηκε στη θάλασσα. Η ήλικια τους αντιστοιχεί στη βάση του Πλεισταίνου (BUNDSCHEUH, 1986). Το όρατο τόχος πάχος είναι 20 περίπου μέτρα και εμφανίζονται βορειοδυτικά του χωριού Κάστρο στην ομώνυμη τοποθεσία.

β. Σχηματισμός Λυγιάς: Αποτελεί τον υπερκιμένο σχηματισμό των Κροκαλοπαγών της Ψηλής Ράχης και περιλαμβάνει αργίλους, μάργες, άμμους και ψαμμίτες που θριαμένες φορές εναλλάσσονται σε στρώματα μεταβαλλόμενου πάχους συνήθως 10-60 εκατοστών. Οι μάργες είναι ανοικτοκίτρινες ως ανοικτόφραγες περιέχουν σε ορισμένες θέσεις πολλά απολιθώματα (Μαλάκια, Ελασματοβράγχια και Κοράλια) και είναι ως επί το πλείστον συνεκτικές ως πολύ συνεκτικές. Οι άργιλοι είναι ανοικτοκίτρινοι, ανοικτόφραγοι περιέχουν σε ορισμένες θέσεις πολλά απολιθώματα (Μαλάκια, Ελασματοβράγχια, Κοράλια και αποτυπωμάτα φύλλων) ενώ σε άλλες θέσεις παρατηρούνται λεπτές ενδιαστρώσεις λιγνιτικών οριζόντων. Οι άμμοι είναι ανοικτοκίτρινοι κυρίως λεπτόκοκκοι, παρόυσιάζουν συχνά εντυπωσιακές σταυρωτές στρωσίες και κατά θέσεις περιέχουν κροκάλες από κερατολιθικά και ασβεστολιθικά πετρώματα. Οι ψαμμίτες είναι κυρίως μεσο-χειρόκοκκοι περιέχουν κατά θέσεις κροκάλες από κερατολιθικά και ασβεστολιθικά πετρώματα και είναι πολύ συνεκτικοί.

Ο σχηματισμός της Λυγιάς στο σύνολό του καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής της μελέτης, έχει ηλικία Μέσο Πλεισταίνου - Κατώτερο Πλειστόκαινου (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, 1971, BUNDSCHEUH 1986) και μεγιστού όρατο πάχος 400 περίπου μέτρα. Τυπικές χαρακτηριστικές εμφανίσεις του σχηματισμού υπάρχουν δυτικά του χωριού Λυγιά και κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής. Επιφανειακά πάνω από τον σχηματισμό της Λυγιάς αναπτύσσεται κατά περιοχές που συμπίπτουν με επιφανειακές επιπέδωσης. Ένας χαλαρός σχηματισμός ερυθρού υλικού πάχους ως 2 μέτρων, που έχει μεταβλητή σύσταση ανάλογα με τους λιθολογικούς τύπους τους οποίους καλύπτει και από την αποδάρωση των οποίων προέρχεται.

γ. Σχηματισμός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας: Πρόκειται για πορρώδεις ασβεστοτικούς ψαμμίτες οι οποίοι κατά θέσεις περιέχουν πιο αδρομερή ή πιο λεπτομερή υλικά που προέρχονται από διάφορα πετρώματα (Εικ. 3). Κατά θέσεις περιέχουν πολλά απολιθώματα (Κοράλλια, Ελασματοβράγχια) ενώ σε ορισμένες εντοπίσθηκαν Strombus bueboni που δύονται στον σχηματισμό Τυρόπινο ήλικια (WINTER, 1979). Καλύπτει ασύμφωνα τον σχηματισμό της Λυγιάς όχι πάχος ως 2 μέτρα και εμφανίζεται κυρίως στην περιφέρεια της μορφολογικής έξαρσης της χερσονήσου της Κυλλήνης κατά τους WINTER (1979), KOWALCZYK & WINTER (1979). Χαρακτηριστικές όμως εμφανίσεις του σχηματισμού εντοπίσθηκαν όχι μόνο στην περιφέρεια της μορφολογικής έξαρσης αλλά και σε πολλά άλλα σημεία όπου υπάρχουν μεγάλες εμφανίσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το ακρωτήριο Μέλισα ως την κύρια εμφάνιση των εβαποριτών, και πάνω από αυτούς, ο σχηματισμός παρατηρείται να ακολουθείται με μικρές κάμψεις και παρέλξεις, είτε μετατιθέμενος από μικρά ρήγματα την μορφολογική έξαρση (Εικ. 4). Η μετάθεση αυτή του χαρακτηριστικού γεωμετρικού σχηματισμού υποδεικνύει τις νεοκτετονικές κινήσεις και το μέγεθός τους, οι οποίες εντοπίζονται στο διάστημα του Ολακάνου.

δ. Αλλοιασιακές Αποθέσεις: Πρόκειται για πρόσφατες χαλαρές αποθέσεις οι οποίες καταλαμβάνουν όλη την πεδινή επίπεδη έκταση. Αποτελούνται κυρίως από αργίλους, ίλιο, άμμους και κροκάλες. Συχνά περιλαμβάνουν φυτικά λείψανα και ενδιαστρώσεις λιγνιτικών οριζόντων. Το πάχος σύμφωνα με τα δεδομένα των γεωτρήσεων φθάνει τα 10-15 μέτρα ενώ καλύπτουν ασύμφωνα δύος τους προηγούμενους σχηματισμούς.

ε. Παράκτιες Αποθέσεις: Χαλαρά λεπτομερή και αδρομερή υλικά (άμμοι διαφόρων μεγεθών, κροκαλών κτλ.) τα οποία παρατηρούνται κατά μήκος όλης σχεδόν της ακτής της χερσονήσου.




Εικ. 2. Εμφάνιση εβαποριτών 500m δυτικά του χωριού Κάστρο.

Fig. 2. Evaporites outcrop, 500m western of Kastro village.



Εικ. 3. Εμφάνιση του σχηματισμού Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας στη βόρεια ακτή της χερσονήσου της Κυλλήνης.

Fig. 3. Outcrop of Glossa formation at the northern coast of Kyllini peninsula.



Εικ. 4. Γεωλογικός χάρτης και γεωλογική τοπή της περιοχής Ακρωτηρίου Μέλισσας-Κάστρου. Διακρίνεται η παρουσία του σχηματισμού Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας σε δύορες οικομετρικές θέσεις. (1: Παράκτες αποθέσεις αλυσίδες, 2: Συμπατιαός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας, 3: Σχηματισμός Λυγάς, 4: Σημειωτόριος Εβαποριτών Κάστρου).

Fig. 4. Geological map and geological cross section of the Melissa-Kastro area. Glossa Formation is observed in various altitude positions. (1: Coastal deposits alluvial deposits, 2: Glossa Formation, 3: Lygia Formation, 4: Kastro Evaporites Formation).

στ. Beach Rocks: Πρόκειται όπως είναι γνωστό για συμπαγείς σχηματισμούς οι οποίοι αντιτίθενται σε θαλάσσιο περιβάλλον πλησίον της ακτής και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Η σύστασή τους διαφοροποιείται ανάλογα με τα υλικά της περιοχής όπου παρατηρούνται και έχουν περιορισμένο πάχος. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις Beach Rocks παρατηρούνται στην ακτή δυτικά της Ζηλατίνας, όπου μάλιστα ευρίσκονται σε επίπεδο μέχρι και δύο μετρών πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

ζ. Παλαιά και Νέα πλευρικά κορήματα: Πρόκειται για παλαιά και για νέα πλευρικά κορήματα τα οποία, εκτός από μερικές θέσεις, είναι δύσκολο να διακριθούν μεταξύ τους.

η. Σχηματισμοί Θινών: Πρόκειται για χαρακτηριστικές περιπτώσεις θινών οι οποίες αποτελούνται κυρίως από άμμους ασύνδετους και αναπτύσσονται κατά μήκος του μεγαλύτερου τμήματος των νότιων και των βόρειων ακτών της περιοχής.

3. TEKTONIKH

Οι σχηματισμοί οι οποίοι εμφανίζονται στη χερσόνησο της Κυλλήνης έχουν υποστεί παραμόρφωση που εκφράζεται κυρίως από δύο τεκτονικές μορφές, τις πτυχές και τα ρήγματα, η μελέτη των οποίων έχει και ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της νεοτεκτονικής δομής και εξελίξης.

A. ΠΤΥΧΕΣ

Εκτός από ορισμένες πτυχές όπου οι οποίες παρατηρήθηκαν στους Ασβεστολίθους του Κάστρου και ανήκουν αποκλειστικά στην Άλπική οραγένεση, στην χερσόνησο της Κυλλήνης παρατηρήθηκε και ένας μικρός αριθμός πτυχών κυρίως στον σχηματισμό της Λυγιάς και στον σχηματισμό Ασβεστοψαμμίτων Γλώσσας. Ορισμένες από αυτές δεν οφείλονται σε τεκτονικά αίτια αλλά σε συνιζηματογενή φαινόμενα λόγω υποθαλάσσιων ενδοστρωματικών ολισθήσεων, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το ότι τα εκατέρωθεν στρώματα παρέμειναν ανέπαφα. Οι υπόλοιπες οφείλονται σε τοπικές παρέλξεις στα δρία μεγάλων ρηγμάτων όπως για παράδειγμα καντά στην ακτή της Ζηλατίνας από όπου διέρχεται ένα σημαντικό ρήγμα διεύθυνσης ΒΒΔ-ΝΝΔ.


Μία περίπτωση μακροπτυχής-κάμψης (αντικλινική δομή) με γενική διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΔ είναι αυτή που ο άξονάς της διέρχεται από την κύρια εμφάνιση των εβαπορίτων (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, UNDERHILL 1985). Η αντικλινική δομή που οφείλεται σε διαπειρικά φαινόμενα των εβαπορίτων κατά τους προηγούμενους ερευνητές τονίζεται από την γραμμική ανάπτυξη των εμφανίσεων των Άλπικων σχηματισμών κατά μήκος του άξονά της, καθώς επίσης και από την αντίθετη φορά των κλίσεων των στρωμάτων των μεταλπικών σχηματισμών εκατέρωθεν του άξονα. Σύμφωνα με τις δικές μας παρατηρήσεις οι αλλαγές στη φορά των κλίσεων των στρωμάτων εκατέρωθεν του άξονα του αντικλίνουν δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντίθετα παρατηρήθηκε μια πολυπλοκότητα στη φορά και τη διεύθυνση των κλίσεων που μαζί με την παρουσία εγκάρσιων και επιμήκων προς τον άξονα ρηγμάτων φανερώνουν μία πολυπλοκότητα στη δομή η οποία θα περιγραφεί στη συνέχεια.

B. ΡΗΓΜΑΤΑ

Τη συνέχεια των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται στην χερσόνησο διακόπτει ένας σημαντικός αριθμός ρηγμάτων τα οποία παρουσιάζονται στην εικόνα 5 ενώ τα σημαντικότερα από άποψη διαμέρφωσης νεοτεκτονικής δομής και εξελίξης σημειώνονται και στον χάρτη της εικόνας 1.

Τα ρήγματα εντοπίσθηκαν αρχικά από τις αεροφωτογραφίες και στη συνέχεια έγινε προσπάθεια αναγνώρισή τους στο ύπαιθρο. Ορισμένα από τα ρήγματα τα οποία έτεμναν τους Άλπικους σχηματισμούς ή τους οριοθετούσαν αναγνωρίσθηκαν εύκελα, λόγω της παρουσίας καλών επιφανειών διάρρρησης ενώ τα περισσότερα, κυρίως αυτά που έτεμναν μόνο Μεταλπικούς σχηματισμούς, ήταν δύσκολο να επιβεβαιωθούν εξ αιτίας του ευαποσάθρωτου χαρακτήρα των σχηματισμών αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιβεβαίωση των ρηγμάτων έγινε από:

α. Τις απότομες μορφολογικές κλίσεις ή ασυνέχειες που οριοθετούσαν περιοχές με μικρές μεσες κλίσεις όπως την περιοχή ανατολικά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Robinson.



Εικ. 5. Ο ρηγιγενής ιστός της χερσονήσου της Κυλλήνης και τα 3 συστήματα διευθύνσεων των ρηγμάτων.

Fig. 5. The fault pattern of the Kyllini peninsula and the 3 groups of striking of the faults.

β. Την απότομη διακοπή χαρακτηριστικών σχηματισμών πάνω σε άλλους με πλέον αντιπρωπευτικό παράδειγμα την διακοπή του σχηματισμού Ασβεστοψαμμίτων Γλώσσας πάνω σε στρώματα του σχηματισμού της Λυγιάς στο γήπεδο του χωριού Κάστρο.

γ. Την παρουσία εκατέρωθεν γεωμετρικών σχηματισμών (σχηματισμός Ασβεστοψαμμίτων Γλώσσας) σε διαφορετικά υψόμετρα.

δ. Την απότομη μεγάλη κάμψη στρωμάτων λόγω πάρελξης στα μεγάλα ρήγματα με πλέον αντιπρωπευτικό παράδειγμα την κάμψη που παρατηρείται κατά μήκος του δρόμου Ψηλής Ράχης-ακτής στον σχηματισμό της Λυγιάς.

Μετά τη χαρτογράφηση των ρηγμάτων έγινε στατιστική επεξεργασία των διευθύνσεών τους από την οποία προέκυψε ότι ανήκουν σε τρία συστήματα ήτοι:

α. Το πρωτεύον σύστημα έχει διεύθυνση B-N δηλαδή συμπίπτει με τη γενική διεύθυνση της αντικλινικής δομής που δέχονται οι ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1969, UNDERHILL 1985.

β. Το δευτερεύον και τρίτεύον σύστημα έχουν διευθύνσεις BA-NΔ και A-Δ αντίστοιχα οι οποίες είναι σχεδόν εγκάρσιες στο πρωτεύον σύστημα.

Οπως διαπιστώθηκε από τις παρατηρήσεις στο ύπαιθρο τα ρήγματα του πρώτου συστήματος είχαν γενικά πολύ μεγάλες κλίσεις (70° - 90°) και ήταν συχνά κατακόρυφα. Αντιπρωπευτικό παράδειγμα τέτοιων κατακόρυφων ρηγμάτων είναι αυτά που ενεργοποιήθηκαν κατά τους σεισμούς της 16.10.1988 και ευρίσκονται στην ανατολική πλευρά του Κάστρου (Εικ. 6). Η δυναμική και κινηματική ανάλυση στα ρήγματα αυτά δεν κατέστει δυνατό να γίνει εξ αιτίας της μη διατήρησης στις επιφάνειές τους γραμμών τεκτονικής ολίσθησης.

Τα ρήγματα που ανήκαν στο δευτερεύον και τρίτεύον σύστημα είχαν τιμές κλίσεων μικρότερες (50° - 70°) από αυτές των ρηγμάτων του πρώτου συστήματος. Σε ορισμένα εξ αυτών (Εικ. 7) παρατηρήθηκαν γραμμές τεκτονικής ολίσθησης που δεχόνται κίνηση κατά κλίση ή κίνηση κατά κλίση και με μικρή οριζόντια ολίσθηση κατά παράταξη ταυτόχρονα, δηλαδή ορθοκανονικά πλαγιοκανονικά ρήγματα αντίστοιχα.

Η ηλικία των ρηγμάτων είναι δυνατό να προσδιορισθεί έμμεσα από την ηλικία των σχηματισμών που είτε τέμνουν ή οριθετούν είτε αφήνουν ανέπαφους. Εται πολλά από τα ρήγματα (ανεξάρτητα από το σύστημα στο οποίο ανήκουν) έχουν βέβαια ηλικία Πλειστόκαινο-Πλειστόκαινο επειδή τέμνουν τους σχηματισμούς Ψηλής Ράχης και Λυγιάς ενώ είναι πιθανό να έχουν δράσει και στο Ολόκαινο χωρίς όμως αυτό να είναι δυνατό να τεκμηριωθεί. Άλλα όμως ρήγματα (π.χ. αυτά που σημειώνονται στο χάρτη της Εικόνας 4) ανεξάρτητα αν έχουν δράσει ή όχι στο Πλειστόκαινο-Πλειστόκαινο έχουν εξακριβωθέντα δράση και στο Ολόκαινο διότι τέμνουν ή οριοθετούν εμφανίσεις του σχηματισμού Ασβεστοψαμμίτων Γλώσσας.

3. Η ΓΕΩΔΟΓΙΚΗ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Με βάση την χαρτογράφηση, τις τεκτονικές μετρήσεις και παρατηρήσεις, την υπάρχουσα βιβλιογραφική ενημέρωση και τέλος τα δεδομένα των γεωτρήσεων (ESSO 1962, ΚΑΜΠΕΡΗΣ, 1987) αποκτήθηκε μια σαφής εικόνα της γεωλογικής-νεοτεκτονικής δομής της χερσονήσου της Κυλλήνης.


Συγκεκριμένα στην περιοχή της μελέτης εμφανίζονται Αλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι ανήκουν στην Ιόνια ενότητα και αποτελούν το υπόβαθρο. Οι Αλπικοί σχηματισμοί συγκροτούν ένα τεκτονικό κέρας με γενική διεύθυνση B-N, που όμως δεν έχει μία απλή μορφή αλλά χαρακτηρίζεται από μια σύνθετη γεωμετρία και πολυπλοκότητα που οφείλεται κυρίως στην παρουσία ρηγμάτων τόσο ως προς την επιμήκη διεύθυνση δηλαδή B-N όσο και ως προς την εγκάρσια δηλαδή A-Δ και BA-NΔ πολλά από τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί (Εικ. 5). Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κατά μήκος της γενικής διεύθυνσης B-N υφίστανται: (i) στα Λουτρά Κυλλήνης η επιφάνεια του υποβάθρου σε υψόμετρα ~600 μέτρα (δεδομένα γεωτρήσεων), (ii) ένα χιλιόμετρο βρειότερα το υπόβαθρο απαντά στα 200 μέτρα, (iii) 0,5 χιλιόμετρα ακόμη βρειότερα το υπόβαθρο απαντά στα ~300 μέτρα και τέλος (iv) στο χωριό Κάστρο στα 200 μέτρα.

Άλλα και ως προς την επιφημή διεύθυνση A-Δ παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ως προς την θέση του Αλπικού υποβάθρου που δεν δικαιολογούνται μόνο από την κύρτωση της αντικλινικής δομής. Εται το υπόβαθρο στο Κάστρο εμφανίζεται στα 200 μέτρα ενώ 5 χιλιόμετρα ανατολικότερα σε ~400 μέτρα (δεδομένα γεωτρήσεων).



Εικ. 6. Ρήγματα με διεύθυνση B-N περίπου ανατολικά του χωριού Κάστρο στα οποία ήρθαν προστιθηκές μετακίνησης των εκατέρωθεν ρηγμάτων κατά τους σεισμούς της 16.10.1988.

Fig. 6. Faults striking N-S, eastern of Kastro village. They were reactivated during the earthquakes of 16.10.1988.



Εικ. 7. Ρήγμα με στοιχεία ($67^{\circ}/330^{\circ}$) που ανήκει στο δεύτερο σύστημα ρηγμάτων. Διακρίνονται οι γραμμές τεκτονικής ολίσθησης πάνω στην επιφάνειά του με στοιχεία $55^{\circ}/010^{\circ}$.

Fig. 7. Fault ($67^{\circ}/330^{\circ}$) that belongs to the second order system. Slickensides ($55^{\circ}/010^{\circ}$) were observed on this fault surface.

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρεται ότι το Αλπικό υπόβαθρο παραθυσιάζει μία πολύπλοκη γεωμετρία με κύριες δομές κατά μήκος των διεύθυνσεων Β-Ν και Α-Δ. Η εικόνα δεν στρειλετεί μένο στην Αλπική θρογγόνεση (Ανώτερο Ολιγόκαινο - Κατώτερο Μειόκαινο) αλλά κυρίως στην νέοτε. Κτενική, γενονός που επιβεβαιώνεται και επό την δραστηριοποίηση ρηγμάτων κατά τους σεισμούς της 16-10-1988 που τέμνουν ή οριοθετούν τις Αλπικές εμφανίσεις στη γεωτεκτονική πλευρά του χωριού Κάστρο.

Οι Μεταλπικοί σχηματισμοί έχουν καλύψει σχεδόν όλο σχερώς το Αλπικό υπόβαθρο. Ο σχηματισμός βάσης είναι ο σχηματισμός Κροκαλοπαγών Ψηλής Ράχης ηλικίας Κατωτέρου Πλειστοκαίνου και ακολουθεί ο σχηματισμός της Λυγιάς (Μέσου Πλειστοκαίνου -Κατώτερου Πλειστοκαίνου) ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της χερσονήσου.

Αυτικά του χωριού Κάστρο οι διευθύνσεις και οι κλίσεις των στρωμάτων παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή "αταξία" η οποία φανερώνει την πολύπλοκη νεοτεκτονική παραμόρφωση.

Πάνω από τον σχηματισμό της Λυγιάς επικάθεται ασύμφωνα ο χαρακτηριστικός σχηματισμός των Ασβεστοψαμμιτών της Γλώσσας ο οποίος δεν εμφανίζεται μόνο στην περιφέρεια της κερφολογικής έξαρσης της χερσονήσου αλλά και σε πάρα πολλές άλλες θέσεις, όπου υπέρχουν σημαντικές εμφανίσεις. Οι εμφανίσεις μάλιστα ευρίσκονται σε διαφορετικά υψόμετρα και πολλές από αυτές οριοθετούνται ή μετατίθενται από ρήγματα τα οποία διέρρηξαν τον σχηματισμό μετα την απόθεσή του. Τέλος πάνω σε όλους τους προηγούμενους σχηματισμούς επικάθονται ασύμφωνα τα Αλλούβια, οι Παράκτιες αποθέσεις, τα Beach rocks και οι θίνες.

III. Η ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Με βάση τα δεδομένα της νεοτεκτονικής χαρτογράφησης, τις νεοτεκτονικές παρατηρήσεις και μετρήσεις καθώς επίσης με βάση την αξιολόγηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων από παλαιότερες έρευνες, τόσο στην χερσόνησο της Κυλλήνης όσο και στην ευρύτερη περιοχή, αποκτήθηκε μία ολοκληρωμένη εικόνα της νεοτεκτονικής εξέλιξης (Εικ. 8) η οποία διαφέρει σημαντικά από τις μέχρι τώρα υπάρχουσες απόψεις.

Ειδικότερα η απουσία ιζημάτων του Μέσου-Ανώτερου Μειοκαίνου προδίδει ότι η περιοχή ήταν μεγάλο τμήμα της αναδύθηκε, είτε εξ αιτίας των Αλπικών ορογενετικών κινήσεων που άρχισαν από το Ακούτανιο-Βουρδιγάλιο, είτε εξ αιτίας διαπειρικών κινήσεων οι οποίες έλαβαν χώρα από το Μέσο Μειόκαινο είτε τέλος από συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Στο Κατώτερο Πλειστόκαινο έγινε η απόθεση του σχηματισμού Κροκαλοπαγών Ψηλής Ράχης από τη φύση του οποίου συμπεραίνεται ότι ένα τμήμα τουλάχιστον της χερσονήσου μετατράπηκε σε αβαθή παράκτια περιοχή με εκβολές ποταμών.


Στη συνέχεια από το Μέσο Πλειστόκαινο ως το Κατώτερο Πλειστόκαινο η περιοχή χαρακτηρίζεται από την ταχεία εναλλαγή περιβαλλόντων (θαλάσσιο, υφάλμυρο, ελώδες, παραποτάμιο) που είχε σαν αποτέλεσμα την απόθεση του σχηματισμού της Λυγιάς (άμμοι, μάργες, κροκαλοπαγή, άργιλοι, ψαμμίτες με πολλές ασυμφωνίες, σταυρωτές στρώσεις, ιζηματοδομές, φυτικά λείψανα κτλ.). Ορισμένα τμήματα του Αλπικού υπόβαθρου είναι πιθανό να παρέμειναν έξω από την επιφάνεια της θάλασσας έτσι ώστε να μην αποτελούν στις περιοχές αυτές ιζημάτα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι διαπειρικές κινήσεις και εν γένει ο τεκτονισμός συνεχίσθηκαν χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα έντονες.

Πάνω στο σχηματισμό Λυγιάς αποτέθηκε ασύμφωνα κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο ο σχηματισμός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας. Ο σχηματισμός αυτός αποτέλεσκε όπως φαίνεται στον χάρτη της Εικόνας 1 δικά μόνο περιφερειακά στη μορφολογική έξαρση του Κάστρου -κάτιο που δέχονται οι WINTER 1979, KOWALCZYK & WINTER 1979- αλλά σε ένα μεγάλο τμήμα του χώρου της μορφολογικής έξαρσης, η οποία δεν υφίσταται.

Το τέλος της απόθεσης του σχηματισμού Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας χρονολογεί την έναρξη των (νέων) ανοδικών κινήσεων, οι οποίες ήταν αρκετά έντονες και διαμόρφωσαν την σημερινή μορφολογική εικόνα μέσα στο Ολόκαινο.

Η εμφάνιση του σχηματισμού Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας σε διάφορα υψόμετρα από 0 έως 180 ή πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας δείχνει την ταχύτητα των ανοδικών κινήσεων στην περιοχή του Κάστρου η οποία υπολογίζεται σε μερικά χιλιόστα ανά έτος.

Θα πρέπει να σημεωθεί ότι τα μεγαλύτερα υψόμετρα εμφάνισης των Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας βρίσκονται πολύ κοντά στις θέσεις που παρατηρούνται εβαπορίτες όπως για παράδειγμα δυτικά του χωριού Κάστρο, γεγονός που μπορεί να τον ρόλο του διαπειρισμού



Εικ. 8. Σχηματική απεικόνιση της νεοτεκτονικής διεύθυνσης και εξέλιξης της χερσονήσου της Κυλλήνης: 1: Εραπορτίτες, 2: Σχηματισμός Ασβεστορίθιου Κάστρου, 3: Σχηματισμός Μέσου-Ανώτερου Μειόκαινου, 4: Κροκαλοπαγή Ψηλής Ράχης, 5: Σχηματισμός Λυγιάς, 6: Σχηματισμός Ασβεστοψαμμιτών Γλώσσας, 7: Αλλούβια, 8: Ανοδικές κινήσεις - Διαπειρισμός.

Fig. 8. Schematic representation of the neotectonic structure and evolution of the Kyllini peninsula. 1: Erosion surfaces, 2: Kastrig limestone Formation, 3: Middle Upper Miocene deposits, 4: Psihi Rachi formation, 5: Lygla Formation, 6: Alluvial deposits, 8: Uplifting Diapirism.

ΣΤΙΣ ΑΝΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Με την γενική αυτή ανύψωση της περιοχής συμπαρομάρτουν όπως φαίνεται και άλλα στοιχεία, όπως οι πρόσφατες ανυψώσεις στις γραμμές ακτών (περιοχή Ακρωτηρίου Τρυπητό) και των Beach rock κατά τους πρόσφατους σεισμούς της 16-10-1989 αλλά και εν γένει ή έντονη σεισμική δραστηριότητα. Οσον αφορά το αίτιο των ανοδικών κινήσεων μπορούν να αποδοθούν, είτε στις διαπειρικές κινήσεις των εβαπορίτων της περιοχής Κάστρο, είτε σε ένα πολύπλοκο μηχανισμό κύρια στοιχεία του οποίου είναι η πλευρική συμπίεση λόγω της σύγκλισης των δύο θεσματικών πλακών και η πλαστικότητα του σχηματισμού των εβαπορίτων οι οποίοι -λόγω της συμπίεσης- ωθούνται προς την κατακόρυφη διεύθυνση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- AUBOIN, J., (1959). - Contribution a l' etude géologique de la Grèce septentrionale: les confins de l' Epire et de la Thessalie. Ann. Geol. d. Pays Hell., X., p. 1-525.
- AUBOIN, J., DERCOURT, J., (1962). - Zone préapulienne zone Ionienne et zone du Gavrovo en Péloponnese occidentale, BSGF (713: 785-794; GRSS6F, 190.
- BUNDOSCHUH M. (1986). Geologische Kartierung im Gebiet von Mir sini, Kyllini und Kastron sowie Untersuchungen der Pliozänen und Pleistozänen Faunen der Kyllini-Halbinsel (N. Peloponnes, Griechenland) Dipl. Universitat Frankfurt.
- ESSO (PERRY, L. & TEMPLE, G.P.), (1962). - Εσωτερικές γεωλογικές εκθέσεις Δ.ΕΠ για τις περιοχές παραχωρήσεων Πλαζών, Ζακύνθου-Κυλλήνης, Φιλιατρά και Πύου.
- KAMΠΕΡΗΣ, Ε. (1987). - Γεωλογική και Πετρελαιογεωλογική μελέτη ΒΔ Πελοποννήσου. Διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π.
- KOWALCZYK, G. & WINTER, K. (1979). - Outline of the Cenozoic history of the Kyllini Peninsula. W. Peloponnes. In: Symeonides, N. Papanikolaou D. and Dermitzakis, M. Field guide to the Neogene of Megara-Peloponnesus-Zakynthos Department of Geology and Palaeontology, S.A. No 34.
- MITZOPoulos, M., (1940). - Über das Alter und die Fauna des Noogenes in Elis. Prak. Akad. Ath. Bd. 15, 8, 429-436, Athens.
- PHILIPPSON, A., (1892). - Der Peloponnes. Versuch einer Landeskunde auf geographischer Grundlage 647\$, 2 Karten, Berlin.
- PHILIPPSON, A., (1898). - La tectonique de l' Egee. Ann. Geogr.
- SAVOYAT, E., (1977). - La zone Ionienne. Bull. Soc. Geol. d. France 7e Serie V.XIX, No 1, p. 10-20.
- SCHMIDT, A. (1984). Geologische Kartierung im Gebiet zwischen Kardiakouti, Neokhori, und Kastron sowie Untersuchungen der Pliozänen und Pleistozänen Ablagerungen im Gebiet der Kullini Halbinsel. Dipl. Universitat, Frankfurt.
- ΤΣΟΦΙΑΔΗΣ, Π., (1977). - Νέα Μανωλάς, Χαλανδρίτσα, Πάτρα, Γεωλ. Χάρτες Ελλάδας, 1:50.000, ΙΓΜΕ.
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γ., 1967. - Περί της ηλικίας των παρά τω χωρίω Κάστρο (ΒΔ Πελοπόννησος) αεροστολίθων. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 7: 121-136.
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γ. (1969). - Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας κλ. 1:50.000 Φύλλο "Βαρθολομίο", ΙΓΜΕ, Αθήνα.
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Γ. (1971). - Über die neogenen Ablagerungen im Gebiet von Kyllini (NW. Peloponnes). IGME, Special Publication 11, 1-60.
- HAGEMAN, J. (1977). - Stratigraphy and sedimentary History of the Upper Cenozoic of the Pyrgos area (W. Peloponnesus, Greece). Ann. Geol. Hellen. 28, 299-333.
- UNDERHILL, J.R. (1985) - Neogene and Quaternary tectonics and sedimentation in Western Greece. PhD thesis, Univ. Wales.
- UNDERHILL, J.P. (1986). - Triassic evaporites and Plio-Quaternary diapirism in Western Greece. Journal of the Geological Society, London, Vol. 145, p.p. 269-282.
- WINTER, K.P. (1979). - Zur neotektonischen Entwicklung im Bereich der Kyllini-Halbinsel (Vartholomion sheet W. Peloponnes). In: Kallergis, G. Proceedings of the vi Colloquium on the Geology of the Aegean region, Vol. I (IGME) Greece p.p. 425-434.